



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПокровМЕД»

ИНН 2466196497 КПП 246601001

РАСЧ./СЧЕТ № 40702810231000029280

Красноярское отделение №8646 ПАО СБЕРБАНК

КОРР./СЧЕТ 30101810800000000627 БИК 040407627

АДРЕС: РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ Г. АБАКАН

УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.63 ПОМ.87Н

ТЕЛ. 8 (3902) 248-648

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора ООО «ПокровМЕД»

Асочакова В.А.



ИНФОРМАЦИЯ

О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА, ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Номер	результат оказания медицинских услуг, выполнения работ	правила, условия сохранения эффективно го и безопасного результата лечения	Гарантийны й срок на достижение и лечебный результат	Необходимы е действия по истечению гарантийно го срока результата лечения	возможные последствия бездействия при истечении гарантийного срока результата лечения
1	Микропенная склеротерапия, микросклеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев,	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	увеличение количества ТАЭ, внутрикожных ретикулярных вен

		саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья.		
2	Стволовая склеротерапия	исключение 6 месяцев солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 1*
3.	ЭВЛК	исключение 12 месяцев солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*

4	«Тотал» - ЭВЛК	<p>ного белья, прием флеботоники в. Соблюдение лечебно- охранительн ого режима в послеоперац ионном периоде</p>	Исключение 12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	<p>появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*</p>
5	Минифлеб- эктомия	<p>ного белья, прием флеботоники в. Соблюдение лечебно- охранительн ого режима в послеоперац ионном периоде</p>	Исключение 12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	<p>появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*</p>

флеботонико
в.
Соблюдение
лечебно-
охранительн
ого режима в
послеоперац
ионном
периоде

Примечание 1*

- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- неврологические нарушения: мигреноподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- симптоматический тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия с вероятным развитием летального исхода.

Примечание 2*

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематомы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоза эмболизма,
- летального исхода.